

Dr. med. Beat Burckhardt
PD Dr. med. Hans Merki
Dr. med. Clive H. Wilder-Smith

Spezialärzte für Innere Medizin
spez. Magen-Darm-Krankheiten
Bubenbergrplatz 11

3011 BERN


Tel. 031 / 312 37 37 Fax 031 / 312 37 70
ggp@ggp.ch www.magendarm-bern.com

Préparation pour la coloscopie / coloscopie avec MOVIPREP®

Chère patiente, cher patient

Pour cet examen nous introduisons un tuyau flexible d'environ 8 mm de diamètre, par voie rectale. Celui-ci est pourvu d'un câble en fibre optique et à la pointe une vidéo-puce, ce qui permet de voir sur un écran l'intérieur du colon. Pour l'examen du colon, celui-ci doit être vidé, c'est pour cette raison que vous devez vider votre intestin avant l'examen. L'examen se fait de façon ambulatoire, le plus souvent, et sans l'utilisation d'un tranquillisant ou d'un analgésique. Si vous êtes très nerveux à cause de l'examen, si vous avez eu plusieurs opérations abdominales (adhésions) ou alors régulièrement des maux de ventre, vous pouvez prier votre médecin de vous annoncer pour cet examen avec sédation. Pour assurer une vue optimale dans le colon veuillez vous préparer consciencieusement selon le schéma ci-dessous.

Médicament laxatif :

- Le produit pour vider le colon, vous pouvez vous le procurer à la pharmacie avec l'ordonnance (MOVIPREP®). Vous trouvez des informations approfondies sur notre site internet <http://www.magendarm-bern.com> (→Formulare →Vorbereitung fuer die Koloskopie auf Franzoesisch )
- La solution préparée devrait être mise dans le frigidaire, elle est ainsi meilleure à boire.

Préparation :

La veille de l'examen :

- Durant toute la journée, pas de mets gras, de fruits, de jus de fruits, de muesli, de salades, de légumes ou de médicaments contenant du fer.
- **Vers 18 heures : versez le contenu du sachet A + B dans un récipient et ajoutez 1 litre d'eau.** Buvez ce mélange réparti sur 1 à 2 heures. En plus, nous vous conseillons de boire au minimum un demi-litre d'une autre boisson claire (eau, limonade, thé, soupe claire). Après la première gorgée de MOVIPREP®, vous ne devez plus rien manger de consistant ! Permis sont : yogourt, pudding, crème, bouillon avec peu de matière grasse. Boire est permis (thé avec sucre ou eau non gazeuse, pas de lait).

Le matin du jour de l'examen :

- Ne plus rien manger. Ne buvez que du thé (sans lait!) avec ou sans sucre et de l'eau non gazeuse.
- **Versez le contenu du deuxième sachet A + B dans un récipient et ajoutez 1 litre d'eau.** Buvez le mélange réparti sur 1 à 2 heures. En plus nous vous conseillons de boire un demi-litre d'une autre boisson claire (eau, limonade, thé, soupe claire).
- **Au plus tard 1 heure avant l'examen,** vous devez avoir bu tout le mélange !
- Si vous faites l'examen à l'hôpital sous narcose, vous devez **avoir bu tout le mélange au plus tard 2 heures avant l'examen.**

S'il vous plaît téléphonez-nous, si vous avez une question ou un problème.

Annexe : 1 ordonnance