

Gastroenterologische Gruppenpraxis, Bern

Dr. med. Beat Burckhardt
P.D. Dr. med. Hans Merki
Dr. med. Clive H. Wilder-Smith
Spezialärzte für Innere Medizin, spez. Magen-Darm-Krankheiten

Preparazione per il riflesso del intestino grasso/coloscopia con MOVIPREP®

Egregio Paziente

Per questa esaminazione/analisi usiamo un tubo flessibile con un diametro di 8mm il quale vi viene inserito nel intestino grasso dalla parte posteriore. Alla punta di questo tubo flessibile ce un video-chip con il quale ci e possibile di vedere sullo schermo l'interiore del intestino grasso. Per poter effettuare questo intervento e importante che l'intestino grasso sia vuoto per questo deve essere vuotato in anticipo. Questo intervento normalmente viene fatto ambulante senza l'impiego di calmanti e/o sedativi. Se in caso siete nervosi perche viene fatto questo intervento o già avuto diverse esaminazioni allo stomaco vi preghiamo d'informare il vostro medico così l'ntervento viene fatto con dei calmanti.

Per avere una visualizzazione ottimale del intestino grasso vi preghiamo di prepararvi secondo il seguente schema:

PURGANTE:

- Il mezzo per preparare l'intestino grasso al intervento lo ricevete con la ricetta allegata presso la vostra farmacia (MOVIPREP®). Ulteriori informazioni in 9 lingue le ricevete al sito internet www.moviprep.ch.
- La miscella preparata metterla nel frigorifico (il gusto della miscella e meglio se consumata fredda)

PREPARAZIONE:

Giorno prima del intervento:

- Vi preghiamo di non mangiare durante il giorno i seguenti pasti => mangiare grasso, Frutta, Spremute di Frutta, Cereali, Salate, Verdura o preparati di ferro.
- Alle ore 1800: Versate il contenuto della busta A e B in un recipiente insieme con un litro d'acqua. Nel corso di 1 o 2 ore ingerite il contenuto. Addizionalmente vi consigliamo di bere aparte della miscela mezzo litro di un liquido liscio per esempio (acqua liscia, Limonata liscia, Tè o un brodo).
- Dopo aver preso il primo sorso di MOVIPREP® vi preghiamo di non più mangiare del cibo compatto. E premesso di mangiare i seguenti prodotti: Yogurt, Puddino, Creme, Brodo senza grasso. E anche permesso di bere (Tè con zucchero, Acqua liscia ma non Latte).

IL GIORNO DEL INTERVENTO:

- Non mangiate del cibo compatto. Bevete solamente del Tè (senza Latte) con o senza zucchero o acqua liscia.
- Versate la seconda busta A e B in un recipiente con un litro d'acqua. Vi preghiamo di bere questa miscela entro una o due ore. Addizionalmente vi consigliamo di bere mezzo litro di un liquido liscio (Acqua, Limonata liscia, Tè on un brodo senza grasso).
- Massimo un ora prima del intervento deve essere bevuto tutto il contenuto della miscela.
- Se l'intervento al ospedale viene fatto sotto anestesia, la miscela deve essere ingerita due ore prima.

In caso di ulteriori informazioni e/o chiarimenti, vi preghiamo di contattarci.

Allegato: - Ricetta